

鶏用飼料に使用できる抗菌性飼料添加物のステージと添加量

抗菌性飼料添加物名	添加量		鶏用（ブロイラーを除く） 幼すう用・中すう用	ブロイラー用	
				前期用	後期用
亜鉛バシトラシン	万単位/t		16.8～168	16.8～168	16.8～168
アピラマイシン	g カ価/t		2.5～10	2.5～10	2.5～10
アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン	g カ価/t		5～55	5～55	
エンラマイシン	g カ価/t		1～10	1～10	1～10
クロルテトラサイクリン	g カ価/t		10～55	10～55	
サリノマイシンナトリウム	g カ価/t		50	50	50
センデュラマイシンナトリウム	g カ価/t		25	25	25
ナラシン	g カ価/t		80	80	80
ノシヘプタイド	g カ価/t		2.5～10	2.5～10	2.5～10
バージニアマイシン	g カ価/t		5～15	5～15	5～15
ビコザマイシン	g カ価/t		5～20	5～20	5～20
フラボフォスフォリポール	g カ価/t		1～5	1～5	1～5
モネンシンナトリウム	g カ価/t		80	80	80
ラサロシドナトリウム	g カ価/t		75	75	75
硫酸コリスチン	g カ価/t		2～20	2～20	2～20
アンプロリウム・エトパベート	g/t	アンプロリウム	40～250	40～250	40～250
		エトパベート	2.56～16	2.56～16	2.56～16
アンプロリウム・エトパベート・スルファキノキサリン	g/t	アンプロリウム	100	100	100
		エトパベート	5	5	5
		スルファキノキサリン	60	60	60
デコキネート	g/t		20～40	20～40	20～40
ナイカルバジン	g/t			100	
ハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウム	g/t		40	40	40

※ 鶏（用ブロイラーを除く）：幼すう用（ふ化後おおむね4週間以内の鶏用飼料）、中すう用（ふ化後おおむね4週間を超え10週間以内の鶏用飼料）

※ ブロイラー用：前期用（ふ化後おおむね3週間以内のブロイラー用飼料）、後期用（ふ化後おおむね3週間を超え食用として屠殺する前7日までのブロイラー用飼料）